



**Eur päisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office eur péen
des brevets**

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

03011334.4

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk



Eur päisches
Patentamt

European
Patent Office

Office eur péen
des brevets

Blatt 2 der Bescheinigung
Sheet 2 of the certificate
Page 2 de l'attestation

Anmeldung Nr.:
Application no.: 03011334.4
Demande n°:

Anmeldetag:
Date of filing: 19/05/03
Date de dépôt:

Anmelder:
Applicant(s):
Demandeur(s):
Dade Behring Marburg GmbH
35001 Marburg
GERMANY

Bezeichnung der Erfindung:
Title of the invention:
Titre de l'invention:

Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT)-spezifische Antikörper, ihre Herstellung und Verwendung

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Staat: DE
State:
Pays:

Tag: 05/07/02
Date:
Date:

Aktenzeichen: DEA 10230550
File no.
Numéro de dépôt:


Internationale Patentklassifikation:
International Patent classification:
Classification internationale des brevets:

/

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten:
Contracting states designated at date of filing:
Etats contractants désignés lors du dépôt:

AT/BG/BE/CH/CY/CZ/DE/DK/EE/ES/FI/FR/GB/GR/HU/IE/IT/LI/LU/MC/

Bemerkungen:
Remarks:
Remarques:



Dad Behring Marburg GmbH**2002/B001 – Ma 1248**

Dr. Buck / Mi

Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT) –spezifische Antikörper, ihre Herstellung und Verwendung

Die vorliegende Erfindung betrifft Antikörper, die in wäßriger Lösung selektiv an ein Transferrin-Homologes „Carbohydrate Deficient Transferrin“ (CDT) binden, ohne daß dieses an eine feste Phase gebunden zu sein braucht. CDT ist dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der zwei Oligosaccharidketten, die normalerweise an Asn 413 und/oder Asn 611 des Transferrins gebunden sind, ganz oder im wesentlichen ganz fehlen.

Alkoholismus ist ein weltweit verbreitetes Problem. Es wurden in der Vergangenheit eine Reihe von diagnostischen Testen entwickelt, um Alkoholismus zu diagnostizieren. Die meisten dieser Tests sind jedoch nicht spezifisch für die Erkrankung. Der bisher am weitesten entwickelte Test wurde von Makhlof et al. in der EP-0 605 627 vorgestellt. Die darin offenbarten Antikörper reagieren spezifisch mit CDT, das bei Alkoholikern, nicht jedoch bei Nicht-Alkoholikern gefunden wurde. Damit wurde es möglich, einen Immuntest aufzubauen, mit dessen Hilfe CDT in Alkoholiker-Seren nachgewiesen werden kann. Nachteilig ist bei diesem Test jedoch, daß das nachzuweisende Antigen zunächst an eine Festphase gekoppelt werden muß, da die in der EP-0 605 627 offenbarten Antikörper nicht oder nur ungenügend an CDT binden, welches sich in Lösung befindet.

Es bestand somit die Aufgabe, den CDT-Nachweis in der Weise zu verbessern, daß der Direktnachweis von in Lösung befindlichem CDT in einer Probe möglich wird und somit die Notwendigkeit der Koppelung des nachzuweisenden Antigens an eine feste Phase entfällt.

Diese Aufgabe wurde überraschenderweise durch Bereitstellung von Antikörpern gelöst, die in wäßriger Lösung selektiv an CDT binden, ohne daß dieses an eine feste Phase gebunden zu sein braucht. Mit Hilfe von Epitop-Kartierungsexperimenten wurde festgestellt, daß erfindungsgemäße Antikörper, im Gegensatz zu Antikörpern

aus dem Stand der Technik, an unterschiedliche Sequenzabschnitte des CDT gleichzeitig binden. Daraus wurde abgeleitet, daß es sich bei den von erfindungsgemäßen Antikörpern erkannten Epitopen um diskontinuierliche Epitope handelt.

Die vorliegende Erfindung betrifft somit einen Antikörper, der in wäßriger Lösung selektiv an CDT bindet, ohne daß dieses an eine feste Phase gebunden zu sein braucht. Es wurde festgestellt, daß dieser Antikörper an die gemäß EP-0 605 627 hergestellten Peptide P1 oder P2 nicht oder im wesentlichen nicht bindet, wobei es unerheblich ist, ob die Peptide festphasengebunden oder in Lösung vorliegen.

Selektive Bindung bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung eine ausreichend spezifische oder im wesentlichen spezifische Bindung, die eine deutliche Unterscheidung zwischen CDT einerseits und Humantransferrin andererseits ermöglicht.

Der Begriff „Festphase“ oder „feste Phase“ im Sinne der vorliegenden Erfindung beinhaltet einen Gegenstand, der aus porösem und/oder nicht porösem, in der Regel wasserunlöslichem Material besteht und die unterschiedlichsten Formen aufweisen kann, wie beispielsweise Gefäß, Röhrchen, Mikrotitrationsplatte, Kugel, Mikropartikel, Stäbchen, Streifen, Filter- oder Chromatographiepapier, etc. In der Regel ist die Oberfläche der Festphase hydrophil oder kann hydrophil gemacht werden. Die Festphase kann aus den unterschiedlichsten Materialien bestehen wie beispielsweise aus anorganischen und/oder organischen Materialien, aus synthetischen, aus natürlich vorkommenden und/oder aus modifizierten natürlich vorkommenden Materialien. Beispiele für Festphasenmaterialien sind Polymere wie beispielsweise Zellulose, Nitrozellulose, Zelluloseacetat, Polyvinylchlorid, Polyacrylamid, vernetzte Dextranmoleküle, Agarose, Polystyrol, Polyethylen, Polypropylen, Polymethacrylat oder Nylon; Keramik; Glas; Metalle, insbesondere Edelmetalle wie Gold oder Silber; Magnetit; Mischungen oder Kombinationen derselben; etc. Auch Zellen, Liposomen oder Phospholipidvesikel sollen vom Begriff „Festphase“ mitumfaßt sein.

- 3 -

Die Festphase kann einen Überzug aus einer oder mehreren Schichten aufweisen, beispielsweise aus Proteinen, Kohlehydraten, lipophilen Substanzen, Biopolymeren, organischen Polymeren oder Mischungen hiervon, um beispielsweise die unspezifische Bindung von Probenbestandteilen an die Festphase zu unterdrücken oder zu verhindern oder um beispielsweise Verbesserungen zu erreichen hinsichtlich der Suspensionsstabilität von partikulären Festphasen, der Lagerstabilität, der formgebenden Stabilität oder der Resistenz gegen UV-Licht, Mikroben oder sonstige zerstörend wirkende Agenzien.

Die vorliegende Erfindung betrifft außerdem einen Antikörper, der selektiv an CDT bindet, wobei die Bindung im Bereich der folgenden Sequenzabschnitte (1) bis (4) des CDT erfolgt:

- | | | |
|-----|------------------------|-----|
| (1) | VVARSMGGKEDLIWELL | und |
| (2) | TTEDSIKIMNGEADAMSLDGGF | und |
| (3) | SKLSMGSGNLNLSEPN | und |
| (4) | YEKYLGEELYVKAV. | |

Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin einen solchen Antikörper, dessen Bindung lediglich im Bereich von nur drei oder von nur zwei der vorstehend genannten Sequenzabschnitte (1) bis (4) erfolgt.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei den erfindungsgemäßen Antikörpern um monoklonale Antikörper.

Ganz besonders bevorzugt sind die monoklonalen Antikörper, die von Zellkulturen produziert werden, welche bei der DSZM Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Mascheroder Weg 1b, 38124 Braunschweig, Deutschland am 16. April 2002 (Tag des Eingangs bei der Hinterlegungsstelle) nach Budapester Vertrag wie folgt hinterlegt wurden:

Zellkultur 01-102/01

Eingangsnummer: DSM ACC2541

Zellkultur 98-84/011

Eingangsnummer: DSM ACC2540

Erfindungsgemäß sind auch antigenbindende Fragmente, beispielsweise Fab-, Fab'-Fv- oder F(ab')₂-Fragmente, die aus den vorstehend genannten erfindungsgemäßen Antikörpern nach den jedem Fachmann bekannten Verfahren hergestellt werden können.

Generell sind unter dem Begriff „Antikörper“ im Sinne dieser Erfindung nicht nur komplette Antikörper zu verstehen sondern ausdrücklich auch Antikörperfragmente, wie die bereits genannten Fab-, Fv-, F(ab')₂ oder Fab'-Fragmente sowie auch chimäre, humanisierte, bi- oder oligospezifische, oder „single chain“ Antikörper; des weiteren auch Aggregate, Polymere und Konjugate von Immunglobulinen und/oder deren Fragmenten, sofern die Bindungseigenschaften an das Antigen oder Hapten erhalten sind. Antikörperfragmente lassen sich beispielsweise durch enzymatische Spaltung von Antikörpern mit Enzymen wie Pepsin oder Papain herstellen. Antikörperaggregate, -polymere und -konjugate können durch vielfältige Methoden generiert werden, z.B. durch Hitzebehandlung, Umsetzung mit Substanzen wie Glutaraldehyd, Reaktion mit immunglobulinbindenden Molekülen, Biotinylierung von Antikörpern und anschließende Reaktion mit Streptavidin oder Avidin, etc..

Bei einem Antikörper im Sinne dieser Erfindung kann es sich um einen monoklonalen oder um einen polyklonalen Antikörper handeln. Der Antikörper kann nach den üblichen Verfahren hergestellt worden sein, z.B. durch Immunisierung des Menschen oder eines Tieres, wie z.B. Maus, Ratte, Meerschweinchen, Kaninchen, Pferd, Schaf, Ziege, Huhn (s.a. Messerschmid (1996) BIOforum, 11:500-502), und anschließender Gewinnung des Antiserums; oder durch die Etablierung von Hybridomazellen und der anschließenden Reinigung der sekretierten Antikörper; oder durch Klonierung und Expression der Nukleotidsequenzen bzw. modifizierter Versionen davon, welche die Aminosäuresequenzen kodieren, die für die Bindung des natürlichen Antikörpers an das Antigen und/oder Hapten verantwortlich sind.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist außerdem ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Antikörpers durch Immunisieren eines geeigneten Versuchstieres mit nichtglykosyliertem Transferrin oder CDT, anschließendem Fusionieren der Milzzellen dieses Versuchstieres mit Myelomzellen, wobei antikörperproduzierende Hybridzellen entstehen und anschließend Klonieren der

- 5 -

Hybridzellen und Selektieren eines solchen Hybridzellklons, der einen Antikörper produziert, der in wäßriger Lösung selektiv an CDT bindet, ohne daß dieses an eine feste Phase gebunden zu sein braucht. Schließlich erfolgt die Gewinnung von Antikörpern aus dem solchermaßen selektierten Hybridzellklon nach einem dem Fachmann bekannten Verfahren.

Weiterhin ist ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur Herstellung des Antikörpers durch Immunisieren eines geeigneten Versuchstieres mit nichtglykosyliertem Transferrin oder CDT, anschließendem Fusionieren der Milzzellen dieses Versuchstieres mit Myelomzellen, wobei antikörperproduzierende Hybridzellen entstehen und anschließendem Klonieren der Hybridzellen und Selektieren eines solchen Hybridzellklons, der einen Antikörper produziert, dessen Bindung nach den Ergebnissen einer Epitop-Kartierung im Bereich der folgenden Sequenzabschnitte (1) bis (4) eines CDT erfolgt:

- | | | |
|-----|------------------------|-----|
| (1) | VVARSMGGKEDLIWELL | und |
| (2) | TTEDSIKIMNGEADAMSLDGGF | und |
| (3) | SKLSMGSGNLNLSEPN | und |
| (4) | YEKYLGEELYVKAV; | |

schließlich folgt die Gewinnung von Antikörpern aus dem solchermaßen selektierten Hybridzellklon nach einem dem Fachmann bekannten Verfahren.

Anstelle von nichtglykosyliertem Transferrin oder CDT kann zur Immunisierung eines geeigneten Versuchstieres gemäß einem der vorstehend genannten Verfahren auch ein Peptid enthaltend einen oder mehrere der Sequenzabschnitte (1) bis (4) verwendet werden. Dem Fachmann ist außerdem bekannt, daß ein kurzes Peptid, welches beispielsweise nur aus einem einzelnen oder mehreren der vorstehend genannten Sequenzabschnitte besteht, zur Erzielung einer ausreichenden Immunogenität gegebenenfalls an ein geeignetes Trägermolekül gebunden werden kann. Hierfür geeignete Trägermoleküle, beispielsweise Peptide oder Proteine, sind dem Fachmann bekannt.

Die vorstehend beschriebenen Herstellungsverfahren beinhalten die jedem Fachmann bekannte Hybridom-Technologie zur Herstellung monoklonaler Antikörper, wie sie erstmals im Jahre 1975 von Köhler und Milstein veröffentlicht und

seitdem von zahlreichen Autoren modifiziert oder verbessert wurde. Obwohl diese Technologie häufig zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern aus Mäusezellen verwendet wurden, gibt es auch Publikationen, welche die Herstellung monoklonaler Antikörper anderer Herkunft beschreiben. Darüber hinaus sind auch Verfahren zur Herstellung von Antikörperkonstrukten bekanntgeworden, beispielsweise humanisierter oder bi- oder oligospezifischer oder chimärer Antikörper, die selbstverständlich ebenso zur Herstellung erfindungsgemäßer Antikörper herangezogen werden können.

Die vorliegende Erfindung betrifft auch einen Immunoassay zum Nachweis von CDT in einer Probe; dabei wird ein vorstehend beschriebener erfindungsgemäßer Antikörper oder ein entsprechendes Antikörperfragment mit der Probe in Kontakt gebracht und anschließend die Bildung eines Immunkomplexes unter Beteiligung des CDT qualitativ oder quantitativ bestimmt.

Testkits zur Durchführung eines vorstehend genannten Immunoassays, enthaltend einen erfindungsgemäßen Antikörper oder ein erfindungsgemäßes Antikörperfragment sind ebenso Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Die vorliegende Erfindung wird außerdem durch die nachfolgenden Beispiele erläutert. Diese dienen ausschließlich der exemplarischen Beleuchtung einzelner Aspekte der vorliegenden Erfindung und sind keinesfalls als Einschränkung zu verstehen.

Beispiele

Beispiel 1: Herstellung von Anti-Human-Transferrin-Sepharose

Zur Affinitätsreinigung von Transferrin aus Humanserum (Normalserum und Alkoholiker-Serum) wurde ein Affinitätsträger durch Kopplung von 120 mg Anti-human Transferrin (Dade Behring Marburg GmbH, Marburg, Deutschland) an 0,8 g CNBr-aktivierte Sepharose CL-4B hergestellt.

120 mg Anti-human Transferrin werden gegen 0,1M NaHCO_3 -Lösung dialysiert. 0,8 g Sepharose CL-4B (Amersham Biosciences Europe GmbH, Freiburg, Deutschland) werden mit 0,1M NaHCO_3 -Lösung gewaschen und unter Kühlung mit 1,28 g Bromcyan gelöst in 5 ml Acetonitril versetzt. Die Suspension wird unter Rühren 15 Minuten bei pH 11 und 4°C gerührt. Anschließend wird die Suspension intensiv mit 0,1M NaHCO_3 -Lösung gewaschen. Die aktivierte Sepharose wird in 0,1 M NaHCO_3 -Lösung suspendiert und mit der vorbereiteten Antikörperlösung versetzt und 6 Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Die so hergestellte Anti-Human-Transferrin-Sepharose wird mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung pH 7,2 gewaschen und bis zur Verwendung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung pH 7,2 + 1g/L NaN_3 gelagert.

Beispiel 2: Isolierung von Humantransferrin aus Humanserum (Normalserum und Alkoholiker-Serum)

Zur Affinitätsreinigung von Transferrin aus Humanserum wird die unter Beispiel 1 hergestellte Anti-Human-Transferrin-Sepharose in eine Glassäule gefüllt und mit 100ml phosphatgepufferter Kochsalzlösung pH 7,2 + 1g/L NaN_3 gewaschen. 10ml Humanserum (Normalserum und Alkoholiker-Serum) werden mit einem Fluß von 0,5 ml/Minute auf die Säule aufgetragen und die nichtgebundenen Proteine durch Waschen der Säule mit 50 ml phosphatgepufferter Kochsalzlösung pH 7,2 + 1g/L NaN_3 , 50 ml 1 M NaCl -Lösung und 50 ml Wasser entfernt. Das gebundene Transferrin wird mit 50 ml 0,5 M Glycin-Lösung, dessen pH-Wert mit Salzsäure auf pH 2,5 eingestellt wurde eluiert, sofort durch Zugabe von festem Tris(hydroxymethyl)-aminomethan neutralisiert und gegen phosphatgepufferter Kochsalzlösung pH 7,2 + 1g/L NaN_3 dialysiert.

Beispiel 3: Nichtiglykosyliertes Humantransferrin**a) Rekombinantes nichtglykosyliertes Humantransferrin**

Die Herstellung von rekombinanten nichtglykosyliertem Transferrin erfolgt mit Hilfe üblicher gentechnologischer und molekularbiologischer Methoden und wird in Mason et al. (1993) Biochemistry, 32: 5472-5479 beschrieben.

b) Enzymatische Deglykosylierung von Humantransferrin

60. mg Humantransferrin (z.B. Fa. Calbiochem-Novabiochem GmbH, Bad Soden, Deutschland) werden in 8 ml phosphatgepufferter Kochsalzlösung pH 7,2 mit 10 mM/L EDTA und 1g/L (w/v) Natriumdecyl-sulfat (Fa. Fluka, Best.Nr: 71443) gelöst. Die so vorbereitete Transferrin-Lösung wird im Wasserbad auf 37°C erwärmt und 180 Einheiten (3 Einheiten / mg Transferrin) N Glycosidase F (Fa. Roche, Best.Nr. 1365193) zugegeben. Der Ansatz wird 17 Stunden im Wasserbad bei 37°C inkubiert. Die Vollständigkeit der Deglykosylierung wird mittels SDS-PAGE untersucht (Duan et al (1998) Applied Biochemistry and Biotechnology, 69: 217-224).

Beispiel 4: Herstellung von monoklonalen Antikörpern gemäß dem Stand der Technik

Die Herstellung monoklonaler Antikörpern gemäß dem Stand der Technik erfolgte wie in der Patentschrift EP-0 605 627. B1 beschrieben durch Immunisierung mit transferrinspezifischen Peptidsequenzen P1 und P2. Es wurden die folgenden Hybride / monoklonalen Antikörper erhalten:

Antikörperbezeichnung:	Spezifität:
01-32/062	anti-P1
00-177/012	anti-P1
00-187/016	anti-P2
00-187/027	anti-P2

Beispiel 5: Herstellung der erfindungsgemäßen, monoklonalen Antikörpern**a) Immunisierung von Mäusen**

BALB/c Mäuse wurden jeweils mit 20 µg nichtglykosyliertem Transferrin in komplettem Freund'schen Adjuvans intraperitoneal immunisiert. Nach 4 Wochen erfolgte ein Booster mit jeweils 20 µg nichtglykosyliertem Transferrin in inkomplettem Freund'schen Adjuvans (Fa. ICN Biomedical GmbH, Eschwege, Deutschland) und nach 8 Wochen mit jeweils 20 µg nichtglykosyliertem Transferrin ohne Freund'sches Adjuvans. Die letzten 3 Tage vor der Fusion wurden die Mäuse intravenös mit jeweils 20 µg nichtglykosyliertem Transferrin geboostert.

b) Fusion

Nach dem Töten der Mäuse durch CO₂-Inhalation wurden die Milzen entnommen und Einzelzellsuspensionen in serumfreiem Dulbeccos modifiziertem Eagle Medium (DMEM, Fa. CC Pro GmbH, Neustadt/W, Deutschland) hergestellt. Die Zellen wurden zentrifugiert (652 g) und 2 x in DMEM gewaschen. Anschließend wurde die Zellzahl mittels Trypanblau-Färbung bestimmt. Zu etwa 10⁸ Milzzellen wurden 2x10⁷ Myelomzellen (Sp2/0) gegeben. Nach dem Zentrifugieren (360 g) wurde der Überstand verworfen, 1 ml Polyethylenglycol-Lösung (PEG 4000, Fa. Merck Eurolab, Bruchsal, Deutschland; ca. 50%ig in DMEM) auf das Zellpellet gegeben und nach Resuspension 1 Minute bei 37°C inkubiert. Anschließend wurde tropfenweise ca. 10 ml DMEM zugegeben und 2 bis 4 Minuten bei Raumtemperatur inkubiert. Die fusionierten Zellen wurden abzentrifugiert (326 g) und das Pellet in DMEM + 20% FKS (fötales Kälberserum, Fa. Biowithaker Europe, Verviers, Belgien) + HAT-Lösung (Fa. CC Pro GmbH, Neustadt/W, Deutschland) resuspendiert und in 24 Well-Zellkulturplatten (Fa. Costar) abgefüllt. Die ungefähre Zellkonzentration pro Well betrug 5x10⁴ bis 5x10⁶ Zellen.

2 - 3 Wochen später wurden die entstandenen Zellkolonien (Hybride) entnommen und in neue Kulturplatten überführt.

- 10 -

c) Bestimmung der Antikörperspezifität

Die Spezifität der in die Zellkultur abgegebenen Antikörper wurden in einem ersten Testschritt mit Hilfe von Immunisierungsantigen-beschichteten Mikrotitrationsplatten (Fa. Nunc, Typ B), Beschichtung $1 \mu\text{g/ml} \approx 0,015 \mu\text{g/Vertiefung}$, getestet.

In jede Vertiefung der Mikrotitrationsplatte wurden $100 \mu\text{l}$ Zellkulturüberstand (Verdünnung 1:2) pipettiert und 1 Stunde bei $+15$ bis $+25^\circ\text{C}$ inkubiert. Nach zweimaligen Waschen der Platte mit Waschlösung-POD (OSEW; Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) wurden in jede Vertiefung $100 \mu\text{l}$ anti-Maus IgG/F(ab)₂-POD-Konjugat (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und 1 Stunde bei $+15$ bis $+25^\circ\text{C}$ inkubiert. Nach weiterem zweimaligen Waschen der Platte wurde in jede Vertiefung $100 \mu\text{l}$ Chromogen TMB-Lösung (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und weitere 30 Minuten bei $+15$ bis $+25^\circ\text{C}$ inkubiert. Nach der Inkubation wurde in jede Vertiefung $100 \mu\text{l}$ Stopplösung POD (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und die Mikrotitrationsplatte am BEP II (Behring-ELISA-Prozessor II, Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) bei 450 nm ausgewertet.

In einem zweiten Testschritt wurden die Hybride wie oben beschrieben überprüft mit Hilfe von Mikrotitrationsplatten (Fa. Nunc, Typ B), die mit Humantransferrin (beispielsweise von Fa. Calbiochem-Novabiochem GmbH, Bad Soden, Deutschland) beschichtet waren. Beschichtung $1 \mu\text{g/ml} \approx 0,015 \mu\text{g/Vertiefung}$.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgelistet.

- 11 -

Tabelle 1: Bestimmung der Antikörperspezifität durch Auswertung der Mikrotitrationsplatten am BEP II (Behring-ELISA-Prozessor II) bei 450 nm.

Hybridbezeichnung	Extinktion bei 450 nm	
	Nichtglykosyliertes Humantransferrin	Humantransferrin
98-22/026 (569)	> 2,5	Negativ
98-23/07 (45)	> 2,5	Negativ
98-22/0104 (572)	1,739	Negativ
98-84/011 (1)	> 2,5	Negativ
01-102/01 (113)	> 2,5	Negativ

Legende: negativ = Extinktion (450 nm) < 0,1 OD; bei Verdünnung der untersuchten Hybride keine Abstufung des Signals

d) Klonierung

Einzelne Zellen von Hybriden, die die erfindungsgemäßen Antikörper produzieren (Bindung an nichtglykosyliertes human Transferrin nicht jedoch an human Transferrin, wurden mit einem Mikromanipulator (Fa. Leitz, Wetzlar, Deutschland) kloniert. Die so erhaltene Klonen 98-84/011 und 01-102/01 wurden am 16.04.2002 bei der DSMZ Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Mascheroder Weg 1b, Braunschweig, Deutschland, unter der Eingangsnummer DSM ACC2540 (98-84/011) und DSM ACC2541 (01-102/01) hinterlegt.

e) Bestimmung der Antikörpersubklasse

Die Subklasse der Antikörper 98-84/011 und 01-102/01 wurde mittels IsoStrip™-Mouse Monoclonal Antibody Isotyping Kit- der Fa. Boehringer Mannheim, Deutschland als IgG₁ für 98-84/011 und 01-102/01 bestimmt.

- 13 -

In jede Vertiefung der Mikrotitrationsplatte wurden 100 µl monoklonaler Antikörper (1 µg/ml) pipettiert und 1 Stunde bei +15 bis +25°C inkubiert. Nach zweimaligem Waschen der Platte mit Waschlösung-POD (OSEW; Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) wurden in jede Vertiefung 100 µl anti-Maus IgG/F(ab)₂-POD-Konjugat (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und 1 Stunde bei +15 bis +25°C inkubiert. Nach weiterem zweimaligen Waschen der Platte wurden in jede Vertiefung 100 µl Chromogen TMB-Lösung (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und weitere 30 Minuten bei +15 bis +25°C inkubiert. Nach der Inkubation wurden in jede Vertiefung 100 µl Stopplösung POD (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und die Mikrotitrationsplatte am BEP II (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) bei 450 nm ausgewertet.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgelistet.

Tabelle 2: Bestimmung der Antikörperspezifität durch Auswertung der Mikrotitrationsplatten am BEP II bei 450 nm.

		Extinktion bei 450 nm			
		Nicht-glykosyliertes Human-transferrin	Human-transferrin	Peptid P1	Peptid P2
Antikörper					
Erfindungsgemäße Antikörper	98-22/026	1,578	Negativ	Negativ	Negativ
	98-23/07	2,497	Negativ	Negativ	Negativ
	98-22/0104	1,179	Negativ	Negativ	Negativ
	98-84/011	> 2,5	Negativ	Negativ	Negativ
	01-102/01	2,432	Negativ	Negativ	Negativ
Antikörper aus dem Stand der Technik gegen Peptid P1					
	00-177/012	1,063	0,157	> 2,5	Negativ
	01-32/062	> 2,5	0,151	> 2,5	Negativ
Antikörper aus dem Stand der Technik gegen Peptid P2					
	00-187/016	2,339	Negativ	Negativ	> 2,5
	00-187/027	> 2,5	Negativ	Negativ	> 2,5

Legende: negativ = Extinktion $_{450\text{ nm}} < 0,1$ OD; bei Verdünnung des untersuchten Hybride keine Abstufung des Signals.

Die erfindungsgemäßen Antikörper zeigen nur eine Reaktion mit nichtglykosyliertem Transferrin, wobei die Antikörper aus dem Stand der Technik eine Reaktion mit dem jeweiligen Peptid und dem auf der Festphase gebundenen nichtglykosylierten Transferrin zeigen.

**Beispiel 7: Bestimmung der Spezifität der Antikörper für Antigene in Lösung:
Vergleich erfindungsgemäßer Antikörper mit Antikörpern gemäß
dem Stand der Technik**

- a) Mikrotitrationsplatten (Fa. Nunc, Typ B), wurden mit den erfindungsgemäßen monoklonalen Antikörpern und mit monoklonalen Antikörpern aus dem Stand der Technik beschichtet. Beschichtungskonzentration $1 \mu\text{g/ml} \approx 0,015 \mu\text{g/Vertiefung}$.

In die Vertiefungen der Mikrotitrationsplatte wurden $100 \mu\text{l}$ einer geometrischen Verdünnungsreihe beginnend bei $200 \mu\text{g/ml}$ von a) Humantransferrin, b) enzymatisch deglykosyliertem Humantransferrin, c) Humantransferrin aus Normalserum und d) Humantransferrin aus Alkoholikerserum pipettiert und 1 Stunde bei $+15$ bis $+25^\circ\text{C}$ inkubiert. Nach zweimaligem Waschen der Platte mit Waschlösung-POD (OSEW; Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) wurden in jede Vertiefung $100 \mu\text{l}$ Anti-Human-Transferrin-POD-Konjugat (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und 1 Stunde bei $+15$ bis $+25^\circ\text{C}$ inkubiert. Nach weiterem zweimaligen Waschen der Platte wurden in jede Vertiefung $100 \mu\text{l}$ Chromogen TMB-Lösung (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und weitere 30 Minuten bei $+15$ bis $+25^\circ\text{C}$ inkubiert. Nach der Inkubation wurden in jede Vertiefung $100 \mu\text{l}$ Stopplösung POD (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und die Mikrotitrationsplatte am BEP II (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) bei 450 nm ausgewertet.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.1 und 3.2 aufgelistet.

- 16 -

Tabelle 3.1: Bestimmung der Reaktivität durch Auswertung der Mikrotitrationsplatten am BEP II bei 450 nm.

Extinktion bei 450 nm															
Antigen	Konz [µg/ml]	Antikörper gemäß dem Stand der Technik					Antigen	Erfindungsgemäße Antikörper					Antikörper gemäß dem Stand der Technik		
		98-23/07	98-84/011	01-102/01	01-32/062	00-187/018		00-187/027	Konz [µg/ml]	98-23/07	98-84/011	01-102/01	01-32/062	00-187/018	00-187/027
Human- transferrin	200	1,790	2,5	0,137	Negativ	0,508	0,553	Nichtglyko- syliertes Human- transferrin	200	2,500	2,500	1,773	0,388	2,500	2,500
	100	0,664	2,5	Negativ	Negativ	0,230	0,291		100	2,500	2,500	1,582	0,262	2,193	2,500
	50	0,541	2,5	Negativ	Negativ	0,123	0,170		50	2,500	2,500	1,570	0,160	1,408	2,133
	25	0,491	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ		25	2,500	2,500	1,601	0,104	0,714	1,134
	12,5	0,320	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ		12,5	2,500	2,500	1,274	Negativ	0,442	0,588
	6,25	0,158	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	6,25	2,500	2,500	1,238	Negativ	0,233	0,320	
	3,125	Negativ	1,880	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	3,125	2,600	2,600	1,230	Negativ	0,133	0,183	
	1,56	Negativ	0,604	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	1,56	2,500	2,500	0,680	Negativ	Negativ	Negativ	
	0,781	Negativ	0,407	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	0,781	2,500	2,500	0,680	Negativ	Negativ	Negativ	
	0,391	Negativ	0,264	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	0,391	2,500	2,500	0,722	Negativ	Negativ	Negativ	
	0,195	Negativ	0,169	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	0,195	2,500	2,500	0,436	Negativ	Negativ	Negativ	

negativ: Extinktion (450 nm) < 0,1 OD

positiv: Extinktion (450 nm) ≥ 0,1 OD

- 17 -

Tabelle 3.2: Bestimmung der Reaktivität durch Auswertung der Mikrotitrationsplatten am BEP II bei 450 nm.

Extinktion bei 450 nm															
Antikörper gemäß dem Stand der Technik		Antikörper gemäß dem Stand der Technik		Antikörper gemäß dem Stand der Technik		Antikörper gemäß dem Stand der Technik		Antikörper gemäß dem Stand der Technik		Antikörper gemäß dem Stand der Technik		Antikörper gemäß dem Stand der Technik		Antikörper gemäß dem Stand der Technik	
Konz. [µg/ml]	98-23/07	98-84/011	01-102/01	01-32/062	00-187/016	00-187/027	Anigen	Konz. [µg/ml]	98-23/07	98-84/011	01-102/01	01-32/062	00-187/016	00-187/027	Anigen
Human-Transferrin aus Normalserum	200	0,309	2,5	0,188	Negativ	0,142	0,192	Human-Transferrin aus Alkoholkar-serum	200	0,508	2,5	Negativ	Negativ	0,118	0,133
	100	0,229	2,5	0,116	Negativ	Negativ	0,158		100	0,690	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
	50	0,177	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	0,111		50	0,306	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
	25	0,141	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ		25	0,252	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
	12,5	0,100	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ		12,5	0,181	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
	6,25	Negativ	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ		6,25	0,101	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
	3,125	Negativ	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ		3,125	Negativ	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
	1,56	Negativ	1,204	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ		1,56	Negativ	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
	0,781	Negativ	0,745	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ		0,781	Negativ	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
	0,391	Negativ	0,450	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ		0,391	Negativ	1,676	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
	0,195	Negativ	0,245	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ		0,195	Negativ	0,820	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ

negativ: Extinktion (450 nm) < 0,1 OD

positiv: Extinktion (450 nm) ≥ 0,1 OD

- b) Mikrotitrationsplatten (Fa. Nunc, Typ B), wurden mit den erfindungsgemäßen monoklonalen Antikörpern und mit monoklonalen Antikörpern aus dem Stand der Technik beschichtet. Beschichtungskonzentration $3 \mu\text{g/ml} \approx 0,045 \mu\text{g/Vertiefung}$.

In die Vertiefungen der Mikrotitrationsplatte wurden $100 \mu\text{l}$ einer geometrischen Verdünnungsreihe beginnend bei einer 1:10 Verdünnung von a) Normalserum und b) Alkoholikerserum pipettiert und 1 Stunde bei $+15$ bis $+25^\circ\text{C}$ inkubiert. Nach zweimaligen Waschen der Platte mit Waschlösung-POD (OSEW; Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) wurden in jede Vertiefung $100 \mu\text{l}$ Anti-Human-Transferrin-POD-Konjugat (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und 1 Stunde bei $+15$ bis $+25^\circ\text{C}$ inkubiert. Nach weiterem zweimaligen Waschen der Platte wurde in jede Vertiefung $100 \mu\text{l}$ Chromogen TMB-Lösung (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und weitere 30 Minuten bei $+15$ bis $+25^\circ\text{C}$ inkubiert. Nach der Inkubation wurde in jede Vertiefung $100 \mu\text{l}$ Stopplösung POD (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) eingefüllt und die Mikrotitrationsplatte am BEP II (Fa. Dade Behring, Marburg, Deutschland) bei 450 nm ausgewertet.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 aufgelistet.

- 19 -

Tabelle 4: Bestimmung der Reaktivität durch Auswertung der Mikrotitrationsplatten am BEP II bei 450 nm.

Extinktion bei 450 nm																	
Antigen	Verdünnung	Erfindungsgemäße Antikörper					Antikörper gemäß dem Stand der Technik		Antigen	Verdünnung	Erfindungsgemäße Antikörper					Antikörper gemäß dem Stand der Technik	
		98-23/07	98-22/0104	98-84/011	01-102/01	01-32/062	00-187/016	00-187/016			01-32/062	98-23/07	98-22/0104	98-84/011	01-102/01	01-32/062	00-187/016
Human-Normalserum	1:10	0,318	0,512	2,5	0,150	Negativ	Negativ	Human-Alkoholiker Serum		1:10	0,603	0,861	2,5	0,220	Negativ	Negativ	
	1:20	0,212	0,313	2,5	Negativ	Negativ	Negativ			1:20	0,367	0,545	2,5	0,148	Negativ	Negativ	
	1:40	0,146	0,193	2,5	Negativ	Negativ	Negativ			1:40	0,259	0,391	2,5	0,103	Negativ	Negativ	
	1:80	0,107	0,104	2,5	Negativ	Negativ	Negativ			1:80	0,165	0,205	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	
	1:160	Negativ	Negativ	2,5	Negativ	Negativ	Negativ			1:160	0,128	0,155	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	
Human-Normalserum	1:320	Negativ	Negativ	1,605	Negativ	Negativ	Negativ	Human-Alkoholiker Serum		1:320	0,110	0,118	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	
	1:640	Negativ	Negativ	0,836	Negativ	Negativ	Negativ			1:640	Negativ	Negativ	2,5	Negativ	Negativ	Negativ	

negativ: Extinktion (450 nm) < 0,1 OD

positiv: Extinktion (450 nm) ≥ 0,1 OD

Die erfindungsgemäßen Antikörper ermöglichen eine deutliche Differenzierung zwischen Transferrin (im Normalserum) und CDT (im Alkoholiker-Serum), wobei die Antikörper aus dem Stand der Technik mit beiden Seren keine Reaktion zeigen.

Beispiel 8: Epitop-Kartierung

Scans überlappender Peptide, die aus der Sequenz des humanen Transferrins abgeleitet wurden (13-mere Peptide, 11 Aminosäuren überlappend), wurden mit Hilfe der SPOT-Synthese-Technologie hergestellt. Die Verfahren sind beschrieben in: Wenschuh, H. et al. (2000) Coherent membrane supports for parallel microsynthesis and screening of bioactive peptides. *Biopolymers (Peptide Science)*, 55:188-206. Die Peptide wurden C-terminal an einen Celluloseträger gekoppelt und tragen am N-Terminus einen Reaktivitäts-tag. Nach Abspaltung der Peptide von ausgestanzten SPOTs (96-well Mikrotitrationsplatten) wurden sie auf aktivierte Glas-chips gekoppelt. Das Inkubationsprotokoll für diese Glas-chips lautet wie folgt:

Monoklonale Antikörper gemäß dem Stand der Technik

- Äquilibrierung in TBS-Puffer, pH 8.0
- 2 h Blockierungspuffer, pH 8.0
- 2 h Antikörperinkubation (3 µg/ml) in Blockierungspuffer, pH 8.0
- Waschen mit TBS (0.05% Tween20)
- 2 h Inkubation mit anti-Maus-IgG-POD in Blockierungspuffer, pH 8.0
- 3 x 5 min Waschen mit TBS (0.05% Tween20)
- Detektion mittels Chemolumineszenz (Lumi-Imager), Roche Diagnostics)

Erfindungsgemäßer Antikörper 98-84/011

- Äquilibrierung in TBS-Puffer, pH 8.0
- 2 h Blockierungspuffer, pH 8.0
- 2 h Antikörperinkubation (3 µg/ml) in Blockierungspuffer, pH 8.0
- 3 x 5 min Waschen mit TBS (0.05% Tween20)
- Detektion mittels Chemolumineszenz (Lumi-Imager), Roche Diagnostics)

Der erfindungsgemäße Antikörper wurde direkt mit Peroxidase markiert. Die Methode ist in der Literatur beschrieben: Wilson, M. B. and Nakane, P. K. (1978) Recent developments in the periodate method of conjugating horseradish peroxidase (HRPO) to antibodies, In: Immunofluorescence and Related Staining Techniques (Eds.: Knapp, W.; Holubar, K.; Wick, G.) pp. 215-224.

- 21 -

Nach Auswertung der Untersuchung ergeben sich für die Antikörper gemäß dem Stand der Technik die folgenden bindenden Peptide:

Antikörper gemäß dem Stand der Technik gegen Peptid 1

1. VLAENYNKSDNCE
2. AENYNKSDNCEDT
3. NYNKSDNCEDTPE
4. NKSDNCEDTPEAG

Antikörper aus dem Stand der Technik gegen Peptid 2

1. VHKILRQQQHLEFG
2. KILRQQQHLEFGSN
3. LRQQQHLEFGSNVT
4. QQQHLEFGSNVTDC
5. QHLEFGSNVTDCSG

Die erkannten Sequenzen sind identisch mit den zur Immunisierung eingesetzten Peptiden.

Der erfindungsgemäße Antikörper 98-84/011 reagiert mit vier dominanten Sequenzabschnitten:

1. VVARSMGGKEDLI
2. ARSMGGKEDLIWE
3. SMGGKEDLIWELL
4. TTEDSIAKIMNGE
5. SIAKIMNGEADAM
6. AKIMNGEADAMSL
7. IMNGEADAMSLDG
8. NGEADAMSLDGGF
9. SKLSMGSGGLNLSE
10. LSMGSGGLNLSEPN
11. YEKYLGE EYVKAV

- 22 -

Der Bereich 1. – 3. befindet sich in der N-terminalen Domäne des Transferrins ,
während die Bereiche 4. – 8., 9. – 10. und 11. in der C-terminalen Domäne liegen
und ein diskontinuierliches Epitop darstellen.

SEQUENZPROTOKOLL

<110> Dade Behring Marburg GmbH

<120> Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT) - spezifische
Antikörper, ihre Herstellung und Verwendung

<130> 2002/B001

<140>

<141>

<150> 10230550.1

<151> 2002-07-05

<160> 4

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 17

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 1

Val Val Ala Arg Ser Met Gly Gly Lys Glu Asp Leu Ile Trp Glu Leu

1

5

10

15

Leu

<210> 2

<211> 23

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 2

Thr Thr Glu Asp Ser Ile Ala Lys Ile Met Asn Gly Glu Ala Asp Ala

1

5

10

15

Met Ser Leu Asp Gly Gly Phe

20

<210> 3

<211> 15

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 3

Ser Lys Leu Ser Met Gly Ser Gly Leu Asn Leu Ser Glu Pro Asn

1

5

10

15

<210> 4

<211> 13

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 4

Tyr Glu Lys Tyr Leu Gly Glu Glu Tyr Val Lys Ala Val

1

5

10

Dade Behring Marburg GmbH**2002/B001 – Ma 1248**

Dr. Buck / Mi

Patentansprüche:

1. Antikörper, der in wäßriger Lösung selektiv an Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT) bindet, ohne daß dieses an eine feste Phase gebunden zu sein braucht.
2. Antikörper nach Anspruch 1, der an die gemäß EP-O 605 827 hergestellten Peptide P1 oder P2 nicht oder im wesentlichen nicht bindet.
3. ~~Antikörper nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß sein Bindungsverhalten entweder gegenüber festphasengebundenen oder in wäßriger Lösung befindlichen Peptiden P1 oder P2 festgestellt wurde.~~
4. Antikörper, der selektiv an CDT bindet, dadurch gekennzeichnet, daß die Bindung im Bereich der folgenden Sequenzabschnitte (1) bis (4) des CDT erfolgt:

(1)	VARSMGGKEDLIWELL	und
(2)	TTEDSIKIMNGEADAMSLDGGF	und
(3)	SKLSMGSGNLNLEPN	und
(4)	YEKYLGEYVKAV.	
5. Antikörper nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Bindung lediglich im Bereich dreier der Sequenzabschnitte (1) bis (4) erfolgt.
6. Antikörper nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Bindung lediglich im Bereich zweier der Sequenzabschnitte (1) bis (4) erfolgt.
7. Antikörper nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß er ein monoklonaler Antikörper ist.
8. Monoklonaler Antikörper, der von der Zellkultur mit der Hinterlegungsnummer DSM ACC2540 produziert wird.

9. Monoklonaler Antikörper, der von der Zellkultur mit der mit der Hinterlegungsnummer DSM ACC2541 produziert wird.
10. Antigenbindendes Fragment, herstellbar aus einem Antikörper gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9.
11. Verfahren zur Herstellung des Antikörpers gemäß Anspruch 1 durch Immunisieren eines geeigneten Versuchstieres mit nichtglykosyliertem Transferrin, Fusionieren der Milzzellen dieses Versuchstieres mit Myelomzellen, wobei antikörperproduzierende Hybridzellen entstehen, Klonieren der Hybridzellen und Selektieren eines solchen Hybridzellklons, der einen Antikörper produziert, der in wäßriger Lösung selektiv an CDT bindet, ohne daß dieses an eine feste Phase gebunden zu sein braucht und Gewinnen von Antikörpern aus dem solchermäßen selektierten Hybridzellklon nach einem dem Fachmann bekannten Verfahren.
12. Verfahren zur Herstellung des Antikörpers gemäß Anspruch 4 durch Immunisieren eines geeigneten Versuchstieres mit nichtglykosyliertem Transferrin, Fusionieren der Milzzellen dieses Versuchstieres mit Myelomzellen, wobei antikörperproduzierende Hybridzellen entstehen, Klonieren der Hybridzellen und Selektieren eines solchen Hybridzellklons, der einen Antikörper produziert, dessen Bindung nach den Ergebnissen einer Epitopkartierung im Bereich der folgenden Sequenzabschnitte (1) bis (4) des CDT erfolgt:
 - (1) VVARSMGGKEDLIWELL und
 - (2) TTEDSIKIMNGEADAMSLDGGF und
 - (3) SKLSMGSGNLNLEPN und
 - (4) YEKYLGEELYVKAV;und Gewinnen von Antikörpern aus dem solchermäßen selektierten Hybridzellklon nach einem dem Fachmann bekannten Verfahren.
13. Immunoassay zum Nachweis von CDT in einer Probe, dadurch gekennzeichnet, daß ein Antikörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 oder das antigenbindende Fragment gemäß Anspruch 10 mit der Probe in Kontakt gebracht und die Bildung eines Immunkomplexes unter Beteiligung des CDT qualitativ oder quantitativ bestimmt wird.

- 25 -

14. Testkit zur Durchführung eines Immunoassays gemäß Anspruch 13 enthaltend einen Antikörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 oder das antigenbindende Fragment gemäß Anspruch 10.
-

Dade Behring Marburg GmbH**2002/B001 – Ma 1248****Dr. Buck / Mi****ZUSAMMENFASSUNG****Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT) –spezifische Antikörper, ihre Herstellung und Verwendung**

Die vorliegende Erfindung betrifft Antikörper, die in wäßriger Lösung selektiv an ein Transferrin-Homologes „Carbohydrate Deficient Transferrin“ (CDT) binden, ohne daß dieses an eine feste Phase gebunden zu sein braucht. CDT ist dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der zwei Oligosaccharidketten, die normalerweise an Asn 413 und/oder Asn 611 des Transferrins gebunden sind, ganz oder im wesentlichen ganz fehlen.